検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社技術トランスファーサービス
登録調査機関コード	004

指導者名	-	指導者コード	ME1L
検索者名	-	検索者コード	ME2M
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2023-541537		
外注管理番号	2024016464		
納品種別	03U0A00100		
対話実施日	2024年 4月18日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年 4月 4日		
検索報告書作成日	2024年 4月26日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

本開示は、診断及び予後診断の方法、免疫療法のための組成物、当該組成物を改善する方法、及びそれを使用する免疫療法に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

1a：キメラ抗原受容体（ＣＡＲ）Ｔ細胞療法を必要とする患者の生存の可能性を予測するための方法であって、

1b：前記患者からのアフェレーシス産物中のＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞のレベルを測定することと、

1c：前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の前記レベルから少なくとも部分的に前記患者の前記生存の可能性を決定することと、を含み、

前記患者は、ＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の前記レベルが全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を超える場合、生存の可能性が増加していると判定され、前記患者は、ＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の前記レベルが前記カットオフパーセンテージ値を下回る場合、生存の可能性が減少していると判定される、方法。

【請求項２】

2a:前記カットオフパーセンテージ値が、およそ０～０．１％、０．１％～０．５％、０．５％～１．０％、１．０～５％、５～１０％、１０～１５％、１０～２０％、２０～３０％、３０～４０％、又は４０～５０％である、

2b:請求項１に記載の方法。

【請求項３】

3a：前記患者からの前記アフェレーシス産物中の中間単球のレベルを測定することと、

3b：前記アフェレーシス産物中の中間単球の前記レベルから少なくとも部分的に前記患者の前記生存の可能性を判定することと、を更に含み、

前記患者は、中間単球の前記レベルが全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を下回る場合、生存の可能性が増加していると判定され、前記患者は、中間単球の前記レベルが前記カットオフパーセンテージ値を上回る場合、生存の可能性が減少していると判定される、

3c:請求項１に記載の方法。

【請求項４】

4a：前記カットオフパーセンテージ値が、およそ１％、２％、３％、４％、５％、６％、７％、８％、９％、１０％、１５％、又は２０％である、

4b:請求項３に記載の方法。

【請求項５】

5a：前記患者からの前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞のレベルを測定することと、

5b：前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の前記レベルから少なくとも部分的に前記患者の前記生存の可能性を判定することと、を更に含み、

ＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の前記レベルが全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を上回る場合、前記患者は生存の可能性が増加していると判定され、ＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の前記レベルが前記カットオフパーセンテージ値を下回る場合、前記患者は生存の可能性が減少していると判定される、

5c:請求項１に記載の方法。

【請求項６】

6a：前記カットオフパーセンテージ値が、およそ０．１％、０．２％、０．３％、０．４％、０．５％、０．６％、０．７％、０．８％、０．９％、１％、１～５％、５～１０％、又は１０～２０％である、

6b:請求項５に記載の方法。

【請求項７】

7a：前記患者のベースライン血液学的計数におけるリンパ球対白血球比を測定することと、

7b：前記リンパ球対白血球比から少なくとも部分的に前記患者の前記生存の可能性を判定することと、を更に含み、

前記リンパ球対白血球比がカットオフ値を上回る場合、前記患者は生存の可能性が増加していると判定され、前記リンパ球対白血球比が前記カットオフ値を下回る場合、前記患者は生存の可能性が減少していると判定される、

7c:請求項１に記載の方法。

【請求項８】

8a：前記カットオフ値が、１％、１～５％、５～１０％、１０～１５％、１５～２０％、２０～２５％、２５～３０％、又は３０～３５％である、

8b:請求項７に記載の方法。

【請求項９】

9a：前記患者のベースライン血液学的計数におけるリンパ球対単球比を測定することと、

9b：前記リンパ球対単球比から少なくとも部分的に前記患者の前記生存の可能性を判定することと、を更に含み、

前記リンパ球対単球比がカットオフ値を上回る場合、前記患者は生存の可能性が増加していると判定され、前記リンパ球対単球比が前記カットオフ値を下回る場合、前記患者は生存の可能性が減少していると判定される、

9c:請求項１に記載の方法。

【請求項１０】

10a：前記カットオフ値が、０～０．５、０．５～１．０、１．０～１．５、１．５～２．０、２～５、５～１０、又は１０～１５の間である、

10b:請求項９に記載の方法。

【請求項１１】

11a：免疫療法生成物を製造するための方法であって、

11b：対象由来の血液試料からアフェレーシス産物を調製することと、

　前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞のレベルを測定することと、

11c：前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の前記レベルが、前記アフェレーシス産物中の全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を下回る場合、処理のために回収されるＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の量を増加させることと、を含む、方法。

【請求項１２】

12a:前記カットオフパーセンテージ値が、およそ０～０．１％、０．１％～０．５％、０．５％～１．０％、１．０～５％、５～１０％、１０～１５％、１０～２０％、２０～３０％、３０～４０％、又は４０～５０％である、

12a:請求項１１に記載の方法。

【請求項１３】

13a：前記アフェレーシス産物中の中間単球のレベルを測定することと、

13b：前記アフェレーシス産物中の中間単球の前記レベルが、前記アフェレーシス産物中の全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を上回る場合、更なる処理の前に前記アフェレーシス産物中の中間単球の前記レベルを減少させることと、を更に含む、

13c:請求項１１に記載の方法。

【請求項１４】

14a：前記カットオフパーセンテージ値が、およそ１％、２％、３％、４％、５％、６％、７％、８％、９％、１０％、１５％、又は２０％である、

14a:請求項１３に記載の方法。

【請求項１５】

15a：前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞のレベルを測定することと、

15b：前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の前記レベルが、前記アフェレーシス産物中の全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を下回る場合、処理のために回収されるＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の量を増加させることと、を更に含む、

15c:請求項１１に記載の方法。

【請求項１６】

16a：前記カットオフパーセンテージ値が、およそ０．１％、０．２％、０．３％、０．４％、０．５％、０．６％、０．７％、０．８％、０．９％、１％、１～５％、５～１０％、又は１０～２０％である、

16a:請求項１５に記載の方法。

【請求項１７】

17a：患者における悪性腫瘍の治療のためのＴ細胞を含む組成物であって、

17b：前記患者からのアフェレーシス産物中のＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞のレベルを測定することと、

17c：前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の前記レベルから少なくとも部分的に、前記患者に、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物を投与すべきか、又はキメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物の投与及び併用療法を施すべきかどうかを決定することと、によって特徴付けられ、

前記患者は、ＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の前記レベルが全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を超える場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物を投与され、前記患者は、ＣＤ２７＋ＣＤ２８＋ナイーブＴｈ細胞の前記レベルが前記カットオフパーセンテージ値を下回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物の投与及び前記併用療法を施される、ことによって特徴付けられる、組成物。

【請求項１８】

2a：前記カットオフパーセンテージ値が、およそ０～０．１％、０．１％～０．５％、０．５％～１．０％、１．０～５％、５～１０％、１０～１５％、１０～２０％、２０～３０％、３０～４０％、又は４０～５０％である、

18a:請求項１７に記載の組成物。

【請求項１９】

19a：前記患者からの前記アフェレーシス産物中の中間単球のレベルを測定することと、

19b：前記アフェレーシス産物中の中間単球の前記レベルから少なくとも部分的に、前記患者に、キメラ受容体を含むＴ細胞を含む組成物を投与すべきか、又はキメラ受容体を含むＴ細胞を含む組成物の投与及び併用療法を施すべきかどうかを決定することと、を更なる特徴とし、

前記患者は、中間単球の前記レベルが全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を下回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物を投与され、前記患者は、中間単球の前記レベルが前記カットオフパーセンテージ値を上回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物の投与及び前記併用療法を施される、ことによって特徴付けられる、

19c:請求項１７に記載の組成物。

【請求項２０】

4a：前記カットオフパーセンテージ値が、およそ１％、２％、３％、４％、５％、６％、７％、８％、９％、１０％、１５％、又は２０％である、

20a:請求項１９に記載の組成物。

【請求項２１】

21a：前記患者からの前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞のレベルを測定することと、

21b：前記アフェレーシス産物中のＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の前記レベルから少なくとも部分的に、前記患者に、キメラ受容体を含むＴ細胞を含む組成物を投与すべきか、又はキメラ受容体を含むＴ細胞を含む組成物の投与及び併用療法を施すべきかどうかを決定することと、を更なる特徴とし、

前記患者は、ＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の前記レベルが全白血球のパーセンテージとして測定されるカットオフパーセンテージ値を上回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物を投与され、前記患者は、ＣＤ２７-ＣＤ２８＋ＴＥＭＲＡ　Ｔｒｅｇ細胞の前記レベルが前記カットオフパーセンテージ値を下回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物の投与及び前記併用療法を施される、ことによって特徴付けられる、

21c:請求項１７に記載の組成物。

【請求項２２】

6a：前記カットオフパーセンテージ値が、およそ０．１％、０．２％、０．３％、０．４％、０．５％、０．６％、０．７％、０．８％、０．９％、１％、１～５％、５～１０％、又は１０～２０％である、

22a:請求項２１に記載の組成物。

【請求項２３】

23a：前記患者のベースライン血液学的計数におけるリンパ球対白血球比を測定することと、

23b：前記リンパ球対白血球比から少なくとも部分的に、前記患者に、キメラ受容体を含むＴ細胞を含む組成物を投与すべきか、又はキメラ受容体を含むＴ細胞を含む組成物の投与及び併用療法を施すべきかどうかを決定することと、を更なる特徴とし、

前記患者は、前記リンパ球対白血球比がカットオフ値を上回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物を投与され、前記患者は、前記リンパ球対白血球比が前記カットオフ値を下回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を含む組成物の投与及び前記併用療法を施される、ことによって特徴付けられる、

23c:請求項１７に記載の組成物。

【請求項２４】

8a：前記カットオフ値が、１％、１～５％、５～１０％、１０～１５％、１５～２０％、２０～２５％、２５～３０％、又は３０～３５％である、

24a:請求項２３に記載の組成物。

【請求項２５】

25a：前記患者のベースライン血液学的計数におけるリンパ球対単球比を測定することと、

25b：前記リンパ球対単球比から少なくとも部分的に、前記患者に、キメラ受容体を含むＴ細胞を含む組成物を投与すべきか、又はキメラ受容体を含むＴ細胞の投与及び併用療法を施すべきかどうかを決定することと、を更なる特徴とし、

前記患者は、前記リンパ球対単球比がカットオフ値を上回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞を投与され、前記患者は、前記リンパ球対単球比が前記カットオフ値を下回る場合、キメラ受容体を含む前記Ｔ細胞の投与及び前記併用療法を施される、ことによって特徴付けられる、

25c:請求項１７に記載の組成物。

【請求項２６】

10a：前記カットオフ値が、０～０．５、０．５～１．０、１．０～１．５、１．５～２．０、２～５、５～１０、又は１０～１５の間である、

26a:請求項２５に記載の組成物。

【請求項２７】

27a：前記併用療法が、免疫療法、ＳＲＣキナーゼ阻害剤、Ｔ細胞性二重特異性抗体、抗ＣＤ２０モノクローナル抗体、抗４-１ＢＢ、抗ＣＤ４７、ＴＧＦ-ベータ阻害剤又はドミナントネガティブＴＧＦ-ベータ、ｍＴＯＲ／ＡＫＴアゴニスト、ヒストンデアセチラーゼ阻害剤、シクロホスファミド、フルオロウラシル、ゲムシタビン、ドキソルビシン、タキサン、化学療法若しくは放射線療法、低分子阻害剤、抗腫瘍免疫の増強を標的とする抗体、又は抗炎症薬を含む、

27b:請求項１７～２６のいずれか一項に記載の組成物。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年1月7日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-27	2G045	G01N33/53*(Ｔ細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原)/tx*{ナイーブ,3C,Ｔ},99N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核細胞)/tx	82
2	1-27	2G045	(Ｔ細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原)/tx*{ナイーブ,3C,Ｔ},99N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核)/tx-\1	30
3	1-27	4B063	(Ｔ細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原)/tx*{ナイーブ,3C,Ｔ},99N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核)/tx-\(1+2)	50
4	1-27	外国	G01N33/48/CP*KITE,3C,pharma/ap	15
5	1-27	外国	KITE,3C,pharma/ap-\4	43
6	1-27	外国	G01N33/48/CP*[(CAR+immunotherapy)/tx+chimeric,3C,antigen/tx+adoptive,3C,(cell+therapy+transfer)/tx+cell,3C,therapy/tx]*(apheresis+PBMC),40N,naive/tx-\(4+5)	126
7	1-27	外国	G01N33/48/IP*[(CAR+immunotherapy)/tx+chimeric,3C,antigen/tx+adoptive,3C,(cell+therapy+transfer)/tx+cell,3C,therapy/tx]*(apheresis+PBMC),40N,naive/tx-\(4+5+6)	43
8	1-27	４B065	AA94.X*(Ｔ細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原)/tx*{ナイーブ,3C,Ｔ},99N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核)/tx-\(1+2+3)	198
9	1-27	2G045	(Ｔ細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原),20N,(奏効+効果+応答)/tx*(ナイーブ+ＣＣＲ７+ＣＤ４５ＲＯ+ＣＤ４５ＲＡ+ＣＤ２７+ＣＤ２８),40N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核)/tx-\(1+2+3+8)	92

10	3	外国	[(CAR+immunotherapy)/tx+chimeric,3C,antigen/tx+adoptive,3C,(cell+therapy+transfer)/tx+cell,3C,therapy/tx]*(apheresis+PBMC),99N,{intermediate,5N,monocyte}/tx-\(4+5+6+7)	19
11	3	無	(細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原),20N,(奏効+効果+応答)/tx*中間,10N,単球/tx-\(1+2+3+8+9)	25
12	1-27	2G045	(細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原),20N,(奏効+効果+応答)/tx*(ナイーブ+ＣＣＲ７+ＣＤ４５ＲＯ+ＣＤ４５ＲＡ+ＣＤ２７+ＣＤ２８),40N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核)/tx-\(1+2+3+8+9+11)	9
13	5	無	(細胞療法+養子移植+免疫療法+ＣＡＲ+キメラ抗原),20N,(奏効+効果+応答)/tx*[ＴＥＭＲＡ,40N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核)/tx+{分化,5C,エフェクターメモリ},40N,(アフェレーシス+ＰＢＭＣ+末梢血単核)/tx]-\(1+2+3+8+9+11+12)	4
14	5	外国	[(CAR+immunotherapy)/tx+chimeric,3C,antigen/tx+adoptive,3C,(cell+therapy+transfer)/tx+cell,3C,therapy/tx]*[(apheresis+PBMC),99N,TEMRA/tx+(apheresis+PBMC),99N,{differentiated,3C,effector}/tx]-\(4+5+6+7+10)	103
15	1-27	外国	G01N33/48/CP*[(CAR+immunotherapy)/tx+chimeric,3C,antigen/tx+adoptive,3C,(cell+therapy+transfer)/tx+cell,3C,therapy/tx]*apheresis,40N,(CD27+CD28+CCR7+CD45RA+CD45RO)/tx-\(4+5+6+7+10+14)	29
16	1-27	外国	G01N33/48/IP*[(CAR+immunotherapy)/tx+chimeric,3C,antigen/tx+adoptive,3C,(cell+therapy+transfer)/tx+cell,3C,therapy/tx]*apheresis,40N,(CD27+CD28+CCR7+CD45RA+CD45RO)/tx-\(4+5+6+7+10+14+15)	9

スクリーニング件数合計：0877

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		国際公開第２０２０／０４７４５２号	X	6
2	非特許文献		Locke Frederick L., et al., Tumor burden, inflammation, and product attributes determine outcomes of axicabtagene ciloleucel in large B-cell lymphoma, Blood advances, ２０２０年, Vol. 4, No. 19, 4898-4911,	A	SL10
3	非特許文献		Els Verdegaal, et al., Low-dose interferon-alpha preconditioning and adoptive cell therapy in patients with metastatic melanoma refractory to standard (immune) therapies: a phase I/II study, J Immunother Cancer, ２０２０年, Vol. 8, No. 1, e000166,	Y2	他
4	特許文献		国際公開第２０２０／０２１４３７号	A	10
5	特許文献		特開２００８-２７５３９７号公報	A	2

【提示文献数：5】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1,11,17,27/ 7,9,23,25/ 2,12,18	1	XY1A	1頁16～18行、38頁10行～275頁28行、図1～49	構成要件1a、1b、1c、2b、7c、9c、11a、11b、11c、12a、17a、17b、17c、18a、23b′、23c、25b′、25c、27a、27bに関連。1a:ＣＡＲ療法に対する有効性の値（生存の可能性の予測に相当）は、下記パラメーターの．．．の尺度をさらに含むと記載されている（222頁18～19行）。1b:サンプル（例えば、アフェレーシスサンプル．．．）中の．．．若いＴ細胞（例えば、ナイーブＴ細胞（例えば、ナイーブＣＤ４．．．Ｔ細胞（ナイーブTh細胞）．．．）．．．のレベルと記載されている（222頁20～25行）。ナイーブCD4T細胞はCD27+CD28+である（参考文献1）。1c:細胞（例えば、Ｔ細胞）の集団は、対象からのアフェレーシスサンプル（例えば、白血球アフェレーシスサンプル）から収集されると記載され（75頁14～15行）、細胞レベルは全白血球のパーセンテージであることが示唆されている。応答者（例えば、完全又は部分応答者）は、下記プロフィール．．．を有すると記載され、参照値．．．ナイーブＣＤ４細胞．．．の非応答者数と比べて、高い数で．．．ナイーブＣＤ４細胞．．．を有すると記載されている（225頁17～32行）。ナイーブＣＤ４細胞のレベルが参照値を超える場合、応答者であることが示されている。2b:ＣＡＲ療法に対する有効性の値と記載されている。7c:ＣＡＲ療法に対する有効性の値と記載されている。9c:ＣＡＲ療法に対する有効性の値と記載されている。11a:ＣＡＲを発現するように操作された免疫エフェクター細胞（例えば、Ｔ細胞．．．）を特徴とし、ここで、操作された免疫エフェクター細胞は、抗腫瘍特性を呈示すると記載されている（90頁7～10行）。11b:サンプル（例えば、アフェレーシスサンプル．．．）中の．．．若いＴ細胞（例えば、ナイーブＴ細胞（例えば、ナイーブＣＤ４．．．Ｔ細胞．．．）．．．のレベルと記載されている（222頁20～25行）。11c:細胞（例えば、Ｔ細胞）の集団は、対象からのアフェレーシスサンプル（例えば、白血球アフェレーシスサンプル）から収集されると記載され（75頁14～15行）、細胞レベルは全白血球のパーセンテージであることが示唆されている。応答者（例えば、完全又は部分応答者）は、下記プロフィール．．．を有すると記載され、参照値．．．ナイーブＣＤ４細胞．．．の非応答者数と比べて、高い数で．．．ナイーブＣＤ４細胞．．．を有すると記載されている（225頁17～32行）。ナイーブＣＤ４細胞のレベルが参照値を超える場合、応答者であることが示されている。変更された用量設定のＣＡＲ発現細胞療法を投与すると記載され（226頁22行）、非応答者には増加した用量のCAR発現療法を投与することが示唆されている。12a:ＣＡＲ発現細胞療法と記載されて

1,11,17,27/ 7,9,23,25/ 2,12,18 のつづき				いる。17a:ＣＡＲを発現するように操作された免疫エフェクター細胞（例えば、Ｔ細胞．．．）と記載されている（90頁7～9行）。17b:サンプル（例えば、アフェレーシスサンプル．．．）中の．．．若いＴ細胞（例えば、ナイーブＴ細胞（例えば、ナイーブＣＤ４．．．Ｔ細胞．．．）．．．のレベルと記載されている（222頁20～25行）。17c:細胞（例えば、Ｔ細胞）の集団は、対象からのアフェレーシスサンプル（例えば、白血球アフェレーシスサンプル）から収集されると記載され（75頁14～15行）、細胞レベルは全白血球のパーセンテージであることが示唆されている。応答者（例えば、完全又は部分応答者）は、下記プロフィール．．．を有すると記載され、参照値．．．ナイーブＣＤ４細胞．．．の非応答者数と比べて、高い数で．．．ナイーブＣＤ４細胞．．．を有すると記載され（225頁17～32行）、ナイーブＣＤ４細胞のレベルが参照値を超える場合、応答者であることが示されている。応答者又は非応答者に、ＣＡＲ発現細胞療法を投与すると記載され、非応答者又は部分応答者に、ＣＡＲ発現細胞療法と組み合わせて、追加薬剤（併用療法に相当）．．．を投与すると記載されている（226頁22～26行）。18a:ＣＡＲ発現細胞療法と記載されている。23b′:応答者又は非応答者に、ＣＡＲ発現細胞療法を投与すると記載され、非応答者又は部分応答者に、ＣＡＲ発現細胞療法と組み合わせて、追加薬剤（併用療法に相当）．．．を投与すると記載されている（226頁22～26行）。リンパ球体白血球比の記載はない。23c:ＣＡＲ発現細胞療法と記載されている。25b′:応答者又は非応答者に、ＣＡＲ発現細胞療法を投与すると記載され、非応答者又は部分応答者に、ＣＡＲ発現細胞療法と組み合わせて、追加薬剤（併用療法に相当）．．．を投与すると記載されている（226頁22～26行）。リンパ球対単球比の記載はない。25c:ＣＡＲ発現細胞療法と記載されている。27a:免疫チェックポイント阻害因子（例えば、ＰＤ-１、ＰＤ-Ｌ１、ＴＩＭ-３、ＴＩＧＩＴ及び／若しくはＬＡＧ-３）（低分子阻害剤に相当）と記載され（225頁1～2行）、チェックポイント阻害因子を投与すると記載されている（226頁24～26行）。27b:ＣＡＲ発現細胞療法と記載されている。

1,11	2	A	whole document	構成要件1a、1b′、1c′、11a、11b′、11c′に関連。1a:CCR7+CD45RAの数は、持続的応答性（生存の可能性に相当）に有意に相関すると記載されている（4905頁左第2段落）。1b′:アフェレーシスT細胞表現型と記載され、CCR7+CD45RA+T細胞と記載されている（4901頁右第2段落）。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。1c′:アフェレーシス試料は、CD45+細胞（全白血球）のパーセンテージとして表現されると記載されている（4899頁左第5段落）。アフェレーシスT細胞表現型は、最終製品表現型と直接的に相関すると記載され（4901頁右第2段落）、CD8T細胞中で、CCR7+CD45RA+の数は、持続的応答性に有意に相関すると記載されている（4905頁左第2段落）。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。11a:CAR T細胞と記載されている（4899頁左第4段落）。11b′:アフェレーシスT細胞表現型と記載され、CCR7+CD45RA+T細胞と記載されている（4901頁右第2段落）。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。11c′:アフェレーシス試料は、CD45+細胞（全白血球）のパーセンテージとして表現されると記載されている（4899頁左第5段落）。アフェレーシスT細胞表現型は、最終製品表現型と直接的に相関すると記載され（4901頁右第2段落）、CD8T細胞中で、CCR7+CD45RA+の数は、持続的応答性に有意に相関すると記載されている（4905頁左第2段落）ことから、アフェレーシス試料中のCCR7+CD45RA+のレベルがカットオフパーセンテージを下回る場合は、CCR7+CD45RA+の量を増加させることが示唆される。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。

7,9,23,25/ 8,10,24,26	3	Y2/A	whole document	構成要件7a、7b、7c′、8b′、9a、9b、9c′、10b′、23a、23b′、23c′、24a′、25a、25b′、25c′、26a′に関連。7a:異なる時点；IFNa治療開始以前（ベースラインに相当）．．．に回収された末梢血において、絶対血球数が測定されたと記載され、白血球体リンパ球（LLR）と記載されている（図2）。7b:図2Fにベースラインにおいて、非応答者におけるLLRは応答者のLLRを上回ることが示され、リンパ球対白血球比がカットオフ値を上回る場合、応答者（生存の可能性の増加に相当）であることが示唆される。7c′:養子細胞療法と記載されている。8b′:養子細胞療法と記載されている。9a:異なる時点；IFNa治療開始以前．．．に回収された末梢血において、絶対血球数が測定されたと記載され、単球対リンパ球（MLR）と記載されている（図2）。9b:図2Hにベースラインにおいて、非応答者におけるMLRは応答者のMLRを上回ることが示され、リンパ球対単球比がカットオフ値を上回る場合、応答者であることが示唆される。9c′:養子細胞療法と記載されている。10b′:養子細胞療法と記載されている。23a:異なる時点；IFNa治療開始以前．．．に回収された末梢血において、絶対血球数が測定されたと記載され、白血球体リンパ球（LLR）と記載されている（図2）。23b′:図2Fにベースラインにおいて、非応答者におけるLLRは応答者のLLRを上回ることが示され、リンパ球対白血球比がカットオフ値を上回る場合、応答者であることが示唆される。組成物を投与すべきかどうかを決定するとは記載されていない。23c′:養子細胞療法と記載されている。24a′:養子細胞療法と記載されている。25a:異なる時点；IFNa治療開始以前．．．に回収された末梢血において、絶対血球数が測定されたと記載され、単球対リンパ球（MLR）と記載されている（図2）。25b′:図2Hにベースラインにおいて、非応答者におけるMLRは応答者のMLRを上回ることが示され、リンパ球対単球比がカットオフ値を上回る場合、応答者であることが示唆される。組成物を投与すべきかどうかを決定するとは記載されていない。25c′:養子細胞療法と記載されている。26a′:養子細胞療法と記載されている。

3,4,13,14,19,20	4	A	【0058】【0469】～【0480】図32～38	構成要件3a′、3b′、3c′、4b′、13a′、13b′、13c′、14a′、19a′、19b′、19c′、20a′に関連。3a′:中間体（ＣＤ１４＋ＣＤ１６＋＋）抗原提示単球サブタイプ（中間単球）についての．．．免疫表現型決定パネルを用いたＰＢＭＣの分析と記載されている【0058】。アフェレーシス産物とは記載されていない。3b′:中間体（ＣＤ１４＋ＣＤ１６＋＋）抗原提示単球サブタイプについての．．．ＰＢＭＣの分析と記載され、％白血球として表したと記載されている【0058】。生存の可能性との関係は記載されていない。3c′:ＥＧＦＲＥＤＶ６８２治療と記載されている。4b′:ＥＧＦＲＥＤＶ６８２治療と記載されている。13a′:中間体（ＣＤ１４＋ＣＤ１６＋＋）抗原提示単球サブタイプについての．．．免疫表現型決定パネルを用いたＰＢＭＣの分析と記載されている【0058】。アフェレーシス産物とは記載されていない。13b′:中間体（ＣＤ１４＋ＣＤ１６＋＋）抗原提示単球サブタイプについての．．．ＰＢＭＣの分析と記載され、％白血球として表したと記載されている【0058】。アフェレーシス産物中の中間単球のレベルではない。13c′:ＥＧＦＲＥＤＶ６８２治療と記載されている。14a′:ＥＧＦＲＥＤＶ６８２治療と記載されている。19a′:中間体（ＣＤ１４＋ＣＤ１６＋＋）抗原提示単球サブタイプについての．．．免疫表現型決定パネルを用いたＰＢＭＣの分析と記載されている【0058】。アフェレーシス産物とは記載されていない。19b′:中間体（ＣＤ１４＋ＣＤ１６＋＋）抗原提示単球サブタイプについての．．．ＰＢＭＣの分析と記載され、％白血球として表したと記載されている【0058】。アフェレーシス産物中の中間単球のレベルではない。19c′:ＥＧＦＲＥＤＶ６８２治療と記載されている。20a′:ＥＧＦＲＥＤＶ６８２治療と記載されている。

5,6,15,16,21,22	5	A	【0001】【0014】～【0038】	構成要件5a′、5b′、5c′、6b′、15a′、15b′、15c′、16a′、21a′、21c′、22a′に関連。5a′:各被験者のサンプルを、フローサイトメーターを用いて表面マーカー（ＣＤ４５、ＣＤ２７、ＣＤ３、ＴＣＲ）の測定を行ったと記載され【0033】、表1にTemraのパーセンテージが示されている。アフェレーシスサンプルとは記載されておらず、CD27-CD28+とも記載されていない。5b′:各被験者のサンプルを、フローサイトメーターを用いて表面マーカー（ＣＤ４５、ＣＤ２７、ＣＤ３、ＴＣＲ）の測定を行ったと記載され【0033】、表1にTemraのパーセンテージが示されている。アフェレーシスサンプルとは記載されておらず、CD27-CD28+とも記載されていない。5c′:γδＴ細胞療法と記載されている。6b′:γδＴ細胞療法と記載されている。15a′:各被験者のサンプルを、フローサイトメーターを用いて表面マーカー（ＣＤ４５、ＣＤ２７、ＣＤ３、ＴＣＲ）の測定を行ったと記載され【0033】、表1にTemraのパーセンテージが示されている。アフェレーシスサンプルとは記載されておらず、CD27-CD28+とも記載されていない。15c′:γδＴ細胞療法と記載されている。16a′:γδＴ細胞療法と記載されている。21a′:各被験者のサンプルを、フローサイトメーターを用いて表面マーカー（ＣＤ４５、ＣＤ２７、ＣＤ３、ＴＣＲ）の測定を行ったと記載され【0033】、表1にTemraのパーセンテージが示されている。アフェレーシスサンプルとは記載されておらず、CD27-CD28+とも記載されていない。21c′:γδＴ細胞療法と記載されている。22a′:γδＴ細胞療法と記載されている。

５．備考（検索者用）

(1)補正あり。

(2)提示文献１（CD27+CD28+Th細胞）に関連する資料として、以下の文献（参考文献１）があります。

【文献分類】外国雑誌

【著者・翻訳者名】Worel, Nina, et al.

【論文名・タイトル】Influence of CD27(-) CD28(-) T-Cells on the Therapeutic Outcome in Adult Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma after CART-Infusion

【刊行物名】Blood

【版数・巻・号数】Vol. 134, No. Suppl. 1

【引用頁】1935

【発行日】2019

(3)提示文献３に関連する資料として、以下の文献（参考文献２）があります。

【文献分類】外国雑誌

【著者・翻訳者名】van der Kooij, M. K., et al.

【論文名・タイトル】Successful use of interferon-alpha and adoptive T cell therapy for metastatic melanoma patients failing other treatment options

【刊行物名】Annals of Oncology

【版数・巻・号数】Vol. 29, No. Suppl. 10

【引用頁】xll

【発行日】2018

2024 年 4 月 26 日

検　索　報　告　書 （区分3，4，5，25）（STN検索履歴）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 3　外国特許文献検索 A:外国特許文献検索（外国検索）

指導者 -　コード ME1L　検索者 -　コード ME2M

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-541537　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2024016464　対話実施日 2024 年 4 月 18 日

事前指示 0:非事前指示型_事前対話なし　検索日 2024 年 4 月 4 日

CSDB,学術 0: オプションなし　GIAS ☐　STN ○　その他商用 0:オプションなし　JDREAMⅢ ☐

STN検索履歴 （コマンド"D HIS FUL"での表示内容）	説明
FILE 'CAPLUS'	
L1 1 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON JP2023-541537/AP	本願
D L1 ALL	
FILE 'CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE'	
L2 995 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON BOT A?/AU	本願発明者
L3 155 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON BUDKA J?/AU	本願発明者
L4 10727 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON CHOU S?/AU	本願発明者
L5 76 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON MILLETTI F?/AU	本願発明者
L6 116 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON PLAKS V?/AU	本願発明者
L7 5737 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON ROSSI J?/AU	本願発明者
L8 220 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON KITE PHARMA?/CS	本願出願人
L9 17681 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L2 OR L3 OR L4 OR L5 OR L6 OR L7	本願発明者
L10 77 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L8 AND L9	本願出願人及び本願発明者
L11 65 DUP REM L10 (12 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
L12 226257 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON CAR	CAR
L13 26 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L10 AND L12	本願出願人及び本願発明者によるCARに関する文献
L14 25 DUP REM L13 (1 DUPLICATE REMOVED)	重複排除
D L14 1-25 BIB ABS	
L15 51 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L10 NOT L13	本願出願人及び本願発明者
L16 40 DUP REM L15 (11 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
D L16 1-40 BIB ABS	
FILE 'CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE'	
L1 58197 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON T CELL THERAPY OR CAR-BASED THERAPY OR CHIMERIC ANTIGEN OR CHIMERIC RECEPTOR	T細胞療法
L2 13193 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON (NUMBER OR FREQUENCY OR LEVEL OR AMOUNT) (S) (NATIVE T CELL OR CCR7 OR CD45RA OR CD27 OR CD28)	ナイーブT細胞のレベル
L3 22433 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON APHERESIS	アファレーシス
L4 13 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L3	アファレーシス中のナイーブT細胞のレベルに基づくT細胞療法の評価
L5 12 DUP REM L4 (1 DUPLICATE REMOVED)	重複排除
D L5 1-12 BIB ABS	
L6 136774 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON PBMC	PBMC
L7 22 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L6 NOT L4	PBMC中のナイーブT細胞のレベルに基づくT細胞療法の評価
L8 21 DUP REM L7 (1 DUPLICATE REMOVED)	重複排除
D L8 1-21 BIB ABS	
FILE 'CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE'	
L1 58199 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON T CELL THERAPY OR CAR BASED THERAPY OR CHIMERIC ANTIGEN OR CHIMERIC RECEPTOR	T細胞療法
L2 13194 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON (NUMBER OR FREQUENCY OR LEVEL OR AMOUNT) (S) (NATIVE T CELL OR CCR7 OR CD45RA OR CD27 OR CD28)	ナイーブT細胞のレベル
L3 158953 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON APHERESIS OR PBMC	アファレーシスまたはPBMC
L4 35 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L3	アファレーシスまたはPBMC中のナイーブT細胞のレベルに基づくT細胞療法の評価
L5 117424 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON T CELL THERAPY OR CAR BASED THERAPY OR CHIMERIC ANTIGEN OR CHIMERIC RECEPTOR OR ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY OR CAR T CELL OR ADOPTIVE TRANSFER	T細胞療法
L6 32 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L5 AND L2 AND L3 NOT L4	アファレーシスまたはPBMC中のナイーブT細胞のレベルに基づくT細胞療法の評価
L7 23 DUP REM L6 (9 DUPLICATES REMOVED)	重複排除

D L7 1-23 BIB ABS	
L8 14819 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON (NUMBER OR FREQUENCY OR LEVEL OR AMOUNT) (S) (INTERMEDIATE MONOCYTE OR CD14 OR CD16)	中間単球のレベル
L9 17 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L5 AND L8 AND L3 NOT L4 NOT L6	アファレーシスまたはPBMC中の中間単球のレベルに基づくT細胞療法の評価
L10 13 DUP REM L9 (4 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
D L10 1-13 BIB ABS	
L11 370 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON TEMRA (3A) T CELL	TEMRA T細胞
L12 1 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L5 AND L11 AND L3 NOT L4 NOT L6 NOT L9	アファレーシスまたはPBMC中のTEMRA T細胞のレベルに基づくT細胞療法の評価
D L12 BIB ABS	
FILE 'CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE'	
L1 117429 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON T CELL THERAPY OR CAR BASED THERAPY OR CHIMERIC ANTIGEN OR CHIMERIC RECEPTOR OR ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY OR CAR T CELL OR ADOPTIVE TRANSFER	T細胞療法
L2 158955 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON APHERESIS OR PBMC	アファレーシスまたはPBMC
L3 7984 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON EFFECTOR MEMORY T CELL OR TEM CELL OR TEMRA	TEMRA T細胞
L4 44 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L3	アファレーシスまたはPBMC中のTEMRA T細胞のレベルに基づくT細胞療法の評価
L5 36 DUP REM L4 (8 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
D L5 1-36 BIB ABS	
FILE 'CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE'	
L1 117429 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON T CELL THERAPY OR CAR BASED THERAPY OR CHIMERIC ANTIGEN OR CHIMERIC RECEPTOR OR ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY OR CAR T CELL OR ADOPTIVE TRANSFER	T細胞療法
L2 158955 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON APHERESIS OR PBMC	アファレーシスまたはPBMC
L3 14187 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON LYMPHOCYTE (3A) LEUKOCYTE	リンパ球と白血球
L4 13 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L3	アファレーシスまたはPBMC中のリンパ球と白血球に基づくT細胞療法の評価
L5 13 DUP REM L4 (0 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
D L5 1-13 BIB ABS	
L6 38553 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON LYMPHOCYTE (3A) MONOCYTE	リンパ球と単球
L7 14 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L6 NOT L4	アファレーシスまたはPBMC中のリンパ球と単球に基づくT細胞療法の評価
L8 12 DUP REM L7 (2 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
D L8 1-12 BIB ABS	
FILE 'CAPLUS, BIOSIS, MEDLINE'	
L1 995 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON BOT A?/AU	本願発明者
L2 117429 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON T CELL THERAPY OR CAR BASED THERAPY OR CHIMERIC ANTIGEN OR CHIMERIC RECEPTOR OR ADOPTIVE IMMUNOTHERAPY OR CAR T CELL OR ADOPTIVE TRANSFER	T細胞療法
L5 3649 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON KITE?/CS	本願出願人
L6 55 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L1 AND L2 AND L5	本願出願人及び本願発明者によるT細胞療法に関する文献
L8 220 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON KITE PHARMA?/CS	本願出願人（検索済み）
L9 25 SEA SPE=ON ABB=ON PLU=ON L6 NOT L8	本願出願人及び本願発明者によるT細胞療法に関する文献
20 DUP REM L9 (5 DUPLICATES REMOVED)	重複排除
D L10 1-20 BIB ABS	

2024 年 4 月 26 日

検　索　報　告　書 （区分3，4，5，25）（提示文献の目録及びカテゴリー）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 3　外国特許文献検索 A:外国特許文献検索（外国検索）

指導者 -　コード ME1L　検索者 -　コード ME2M

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-541537　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2024016464　対話実施日 2024 年 4 月 18 日

事前指示 0:非事前指示型_事前対話なし　検索日 2024 年 4 月 4 日

CSDB,学術 0: オプションなし　GIAS ☐　STN ○　その他商用 0:オプションなし　JDREAMⅢ ☐

スクリーニングサーチの結果　※以下の欄は、クラスタ検索の検索報告書と重複する記載については省略可能。

No	提示文献	ISR引用文献カテゴリー	他庁における引用文献追加情報	回答セットNo.	検索者判断結果
2	【文献分類】外国雑誌 【著者・翻訳者名】Locke Frederick L. , et al. 【論文名・タイトル】Tumor burden, inflammation, and product attributes determine outcomes of axicabtagene ciloleucel in large B－cell lymphoma 【刊行物名】Blood advances 【版数・巻・号数】Vol. 4, No. 19 【引用頁】4898－4911 【発行日】2020	X		SL10	A
				提示文献数	1

2024 年 4 月 26 日

検　索　報　告　書 （区分3,4,5,25）（本願発明と提示文献との対比）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 3　外国特許文献検索 A:外国特許文献検索（外国検索）

指導者 −　コード ME1L　検索者 −　コード ME2M

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-541537　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2024016464　対話実施日 2024 年 4 月 18 日

事前指示 0:非事前指示型_事前対話なし　検索日 2024 年 4 月 4 日

CSDB,学術 0: オプションなし　GIAS ☐　STN ○　その他商用 0:オプションなし　JDREAMⅢ ☐

本願との対比

ｸﾚｰﾑ No	文献 No	ｶﾃｺﾞﾘｰ	関連する箇所	本願発明との対比（概要）	本願発明との対比（文献中に具体的に記載されている化合物と本願との対比）
1,11	2	A	whole document	・本願発明者による非特許文献 ・抗CD19キメラ抗原受容体T細胞療法 ・アフェレーシス試料は、生存CD45+細胞（全白血球）のパーセンテージで示される（4989頁） ・アファレーシス中のT細胞表現型は、最終製品の表現型と直接相関する（4901頁）（CCR7+CD45RA+T細胞（%）；図4B） ・製品試料において、CD8T細胞中のCCR7+CD45RA+T細胞の数は、持続的応答と有意に相関する（4905頁左）	構成要件1a、1b′、1c′、11a、11b′、11c′、17a、17b、17c′に関連。 1a:CCR7+CD45RAの数は、持続的応答性（生存の可能性に相当）に有意に相関すると記載されている（4905頁左第2段落）。 1b′:アフェレーシスT細胞表現型と記載され、CCR7+CD45RA+T細胞と記載されている（4901頁右第2段落）。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。 1c′:アフェレーシス試料は、CD45+細胞（全白血球）のパーセンテージとして表現されると記載されている（4899頁左第5段落）。アフェレーシスT細胞表現型は、最終製品表現型と直接的に相関すると記載され（4901頁右第2段落）、CD8T細胞中で、CCR7+CD45RA+の数は、持続的応答性に有意に相関すると記載されている（4905頁左第2段落）。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。 11a:CAR T細胞と記載されている（4899頁左第4段落）。 11b′:アフェレーシスT細胞表現型と記載され、CCR7+CD45RA+T細胞と記載されている（4901頁右第2段落）。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。 11c′:アフェレーシス試料は、CD45+細胞（全白血球）のパーセンテージとして表現されると記載されている（4899頁左第5段落）。アフェレーシスT細胞表現型は、最終製品表現型と直接的に相関すると記載され（4901頁右第2段落）、CD8T細胞中で、CCR7+CD45RA+の数は、持続的応答性に有意に相関すると記載されている（4905頁左第2段落）ことから、アフェレーシス試料中のCCR7+CD45RA+のレベルがカットオフパーセンテージを下回る場合は、CCR7+CD45RA+の量を増加させることが示唆される。CD27+CD28+Th細胞とは記載されていない。

本願発明との対比（文献中に具体的に記載されている化合物と本願との対比）欄における[　]内の記号の定義

１番目の記号：文献記載の化合物の構造が、
◎　：　本願実施例化合物と同一
○　：　本願クレームの定義に含まれるのみ
△　：　構造がかなり類似しているのみ

２番目の記号：文献記載の化合物の利用用途が、
◎　：　本願発明と同一または実質的に同一
○　：　本願発明と一部は同一であるが一部相違
△　：　本願発明と類似