보정서

【보정구분】 명세서등 보정

【제출처】 특허청장

【제출인】

【명칭】 카이트 파마 인코포레이티드

【특허고객번호】 5-2015-052525-9

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 양영준

【대리인번호】 9-1998-000361-9

【포괄위임등록번호】 2017-088557-3

【대리인】

【성명】 이상남

【대리인번호】 9-2000-000107-1

【포괄위임등록번호】 2017-088578-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7026771

【제출원인이 된 서류의 접수번호】 1-1-2023-0864629-15

【보정할 서류】 명세서등

【보정할 사항】

【보정대상항목】 별지와 같음

【보정방법】 별지와 같음

【보정내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 양영준 (서명 또는 인)

대리인 이상남 (서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】 4,000원

【추가심사청구료】 0원

【기타 수수료】 0원

【합계】 4,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

보정서

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 포함하는, 환자에게서 악성종양을 치료하는 방법에 사용하기 위한 조성물이며, 상기 방법은

상기 환자로부터의 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량과 병용 요법을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 상기 수준으로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법을 투여하는 단계를 포함하고,

CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, CD27+CD28+ 나이브 Th 세포의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법이 투여되는, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

제17항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0 내지 0.1%, 0.1% 내지 0.5%, 0.5% 내지 1.0%, 1.0 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 10 내지 20%, 20 내지 30%, 30

내지 40%, 40 내지 50%, 또는 더 바람직하게는 대략 0.27%인, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 19】

제17항에 있어서, 상기 방법은

상기 환자로부터의 상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 수준을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량과 병용 요법을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 중간 단핵구의 상기 수준으로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법을 투여하는 단계를 더 포함하고,

중간 단핵구의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, 중간 단핵구의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법이 투여되는, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 20】

제19항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 또는 20%이고, 바람직하게는 1 내지 5%이고, 더욱더 바람직하게는 대략 3%인, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 21】

제17항에 있어서, 상기 방법은

상기 환자로부터의 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량과 병용 요법을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 성분채집술 생성물 중의 CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 상기 수준으로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법을 투여하는 단계를 더 포함하고,

CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 총 백혈구의 백분율로 측정된 컷-오프 백분율 값보다 높은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, CD27-CD28+ TEMRA Treg 세포의 수준이 상기 컷-오프 백분율 값보다 낮은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법이 투여되는, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 22

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 22】

제21항에 있어서, 상기 컷-오프 백분율 값은 대략 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9%, 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 20%, 바람직하게는 0.05 내지 0.2%, 0.2 내지 0.25%, 0.25 내지 0.5%, 0.5 내지 0.6%, 0.6 내지 0.7%, 0.7 내지 0.8%, 0.8 내지 0.9%, 0.9 내지 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 더 바

람직하게는 대략 0.1705%인, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 23

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 23】

제17항에 있어서, 상기 방법은

상기 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 백혈구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량과 병용 요법을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 백혈구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법을 투여하는 단계를 더 포함하고,

백혈구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, 백혈구에 대한 림프구 비율이 상기 컷-오프 값보다 작은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법이 투여되는, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 24

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 24】

제23항에 있어서, 상기 컷-오프 값은 1%, 1 내지 5%, 5 내지 10%, 10 내지 15%, 15 내지 20%, 20 내지 25%, 25 내지 30%, 30 내지 35%, 바람직하게는 5.2%인, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 25

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 25】

제17항에 있어서, 상기 방법은

상기 환자의 기준선 혈액학 계수치에서 단핵구에 대한 림프구 비율을 측정하는 단계;

상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량을 투여해야 하는지 또는 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 유효 용량과 병용 요법을 투여해야 하는지의 여부를, 적어도 부분적으로, 상기 단핵구에 대한 림프구 비율로부터 결정하는 단계; 및

상기 결정 단계에 기초하여 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량을 투여하거나 또는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법을 투여하는 단계를 더 포함하고,

단핵구에 대한 림프구 비율이 컷-오프 값보다 큰 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량이 투여되고, 단핵구에 대한 림프구 비율이 상기 컷-오프 값보다 작은 경우 상기 환자에게 키메라 수용체를 포함하는 T 세포의 상기 유효 용량과 상기 병용 요법이 투여되는, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 26

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 26】

제25항에 있어서, 상기 컷-오프 값은 0 내지 0.5, 0.5 내지 1.0, 1.0 내지 1.5, 1.5 내지 2.0, 2 내지 5, 5 내지 10, 10 내지 15, 바람직하게는 0.79인, 조성물.

【보정대상항목】 청구항 27

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 27】

제17항 내지 제26항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 병용 요법은 면역요법, SRC 키나제 저해제, T 세포 이중특이적 항체, 항-CD20 단클론성 항체, 항-4-1BB, 항-CD47,

TGF-베타 저해제 또는 우성 음성(dominant-negative) TGF-베타, mTOR/AKT 효능제, 히스톤 데아세틸라제 저해제, 시클로포스파미드, 플루오로우라실, 젬시타빈, 독소루비신, 탁산, 화학요법 또는 방사선요법, 소분자 저해제, 항종양 면역을 향상시키는 것을 목표로 하는 항체, 또는 항염증성 약제를 포함하는, 조성물.